

Analyse de la prédation de loups sur des bovins : le cas des 2 Savoie

VIRAPIN M.(1,3), JABOUILLE S.(2), STURARO E.(3), BRUNSCHWIG G.(1)

(1) VetAgro Sup - INRAE, UMR Herbivores, (2) Direction Départementale des Territoires de Savoie (DDT 73), (3) Université de Padoue, DAFNE



INTRODUCTION

L'intensification des dommages liés à la prédation du loup sur les bovins suscite de nombreux questionnements à l'échelle nationale notamment lorsqu'il est associé avec une production à forte valeur ajoutée.




Figure 1 Évolution de la proportion d'attaques déclarées et de victimes bovines liées à la prédation du loup, à l'échelle nationale, 2010-2020, DREAL AURA - DDT(M)

MATERIEL ET MÉTHODES

- Une analyse détaillée des constats de dommages enregistrés, en Savoie et Haute-Savoie. La base de données était constituée de tous les dégâts signalés sur bovins de ces départements (147 constats sur la période 2015-2020).
- Une enquête en ligne menée auprès de 1591 éleveurs bovins : 673 réponses récoltées.



Figure 2 Photographies issues de constats de dommages : un veau consommé et une génisse blessée, Savoie, Haute-Savoie, 2015-2020

1- DES BOVINS BLESSÉS PARMI TOUTES LES CATEGORIES MAIS PRINCIPALEMENT DES VEAUX TUÉS

- Parmi les 63% de victimes décédées, on relève une majorité de veaux (43%), pour 31% de génissons et 26% d'adultes.
- Parmi les 37% de victimes blessées, on a une majorité d'adultes (68%), 25% de génissons et 7% de veaux.




Figure 3 Typologie des victimes décédées (71 victimes attaquées) et blessées (119 victimes attaquées), Savoie, Haute-Savoie, 2015-2020, (Virapin M., 2021)

2- DES CARCASSES FORTEMENT CONSOMMÉES

- 42% de victimes consommées (dont 12% totalement)
- 21% de victimes non consommées mais présentant des lacérations et/ou des morsures sur l'arrière-train (63% des victimes concernées), le cou (8%) ou le reste du corps (29%).
- 37% de victimes indirectes (dérochements, dispersion, etc...)




Figure 4 Caractéristiques générales des victimes, 190 victimes déclarées attaquées, Savoie, Haute-Savoie, 2015-2020, (Virapin M., 2021,2024)

3- UNE MORTALITE D'ORIGINE INDETERMINÉE

- Malgré 63% de dommages concluant à une responsabilité du loup ne pouvant être exclue (potentielles attaques) et 37% de dommages concluant à une responsabilité du loup est exclue, l'origine de la mortalité reste, dans ces deux cas, majoritairement indéterminée (58% et 56%).




Figure 5 Répartition de la cause de la mortalité (dommages dont la responsabilité du loup est non exclue (93 dommages) / exclue (54 dommages), Savoie, Haute-Savoie, 2015-2020

4- UNE TRÈS FAIBLE DÉCLARATION DES DOMMAGES

- 10% des éleveurs bovins déclaraient leurs dommages.
- 43,5% ont déjà eu au moins une victime bovine non signalée.
- 68% n'ont pas fait de déclaration car ils ne savaient pas si le dommage était lié au loup.
- 40% ne savaient pas comment déclarer (vs 20% savaient).

CONCLUSION

- Ce travail est une première caractérisation de la prédation du loup sur les bovins.
- Difficultés d'identification de la prédation lupine sur les bovins (forte consommation des carcasses, diversité des modes opératoires, reconnaissance complexe des stigmates de prédation).
- Forte sous-évaluation des dommages (cause de mortalité indéterminée, auto-censure des éleveurs par manque de preuves reconnues, méconnaissance des procédures de constatation).
- Nécessité de questionner les dispositifs publics actuels et d'identifier des stratégies d'adaptations face à cette prédation émergente, impactant fortement les territoires d'élevage bovins conduits à l'herbe.

Contact :
morgane.virapin@vetagro-sup.fr

27ème édition, 4 et 5 décembre 2024

